

april 2009

Paddenstoelen.flits

- [Paddenstoel van de maand: Gewone glimmerinktzwam](#)
- [Lenteknotszwam, een indicator voor natte heide](#)
- [Gemakkelijk herkenbare korstjes](#)
- [Eetbare paddenstoelen vervaagd op waarnemingen.be](#)
- [Natuurpunt Ninove op zoek naar voorjaarszwammen](#)

Paddenstoel van de maand: Gewone glimmerinktzwam

Van zodra het niet meer vriest kunnen we de Gewone glimmerinktzwam (*Coprinus micaceus*) vinden. Vooral na regenbuien is deze op rottend hout waar te nemen, alleenstaand of in groepen. De plaatjes zijn zoals bij alle inktzwammen eerst witachtig, dan grijsig en vlug zwart en tenslotte vervloeiend in een inktachtige brij. De naam van deze zwam verwijst verder nog naar de glinsterende korreltjes op de hoed, die gemakkelijk afwrijfbaar en bij oudere hoeden dan ook meestal verdwenen zijn. De glimmerinktzwam is dan nog goed herkenbaar aan de geelbruine hoed en de overlangse groeven. Er zijn echter enkele zeldzamere dubbelgangers. Is de hoed bleek van kleur dan heb je misschien te maken met de Bleke glimmerinktzwam (*Coprinus pallidissimus*) die eveneens een andere sporenvorm dan de gewone heeft. Let wel op dat de steel behaard is (onder de loupe), want anders heb je te doen met de Gladstelige glimmerinktzwam (*Coprinus truncorum*) of de zeer zeldzame Parelinktzwam (*Coprinus saccharinus*) die hiervan enkel microscopisch te onderscheiden valt. Voer je waarnemingen van Gewone glimmerinktzwam in op [waarnemingen.be](#) of stuur ze door naar [Roosmarijn](#)

Lenteknotszwam, een indicator voor natte heide

In de rubriek "Kwesties uit het veld" van het recentste nummer van Natuur.focus lees je hoe op 19 mei 2008 in het Groot schietveld in Brecht de Lenteknotszwam massaal werd gevonden. Dit was de derde Vlaamse vondst van het fel gekleurde zwammetje dat in symbiose leeft met algen. Ook in Limburg werden de zwammetjes reeds op twee plaatsen gezien (Hechtel-Eksel en Kamp van Beverlo). De Lenteknotsjes groeien voornamelijk op kale, natte bodem of in een pioniersvegetatie met Kleine zonnedauw. Dit voorjaar kwamen de lenteknotszwammen reeds half maart tevoorschijn. Vind je kleine (1 cm) oranje knotsjes op plagplekken of in de natte heide, maak dan een foto en stuur die door aan [Roosmarijn](#)

Gemakkelijk herkenbare korstjes

In het voorjaar zijn plaatjeszwammen schaars en dus korstzwammen des te opvallender. Wanneer je een tak omdraait zie je vaak witte, plakkaatvormige of verfachtige substanties. Vele van deze zien er macroscopisch identiek uit, maar de microscopie toont een wereld van verschil. Soorten als Ruwharig elfendoekje, [Groezelig huidje](#) en Wissewasje kan je enkel door middel van microscopie

op naam brengen. Maar er bestaan ook gemakkelijk herkenbare soorten, waarvan de namen al iets meer zeggen. Zo heeft de Roze raspzwam (foto links) duidelijk kleine roze tandjes en groeit de [Paarse eikenschorszwam](#) wel degelijk op eik. Het [Papierzwammetje](#) is spierwit en kan je heel gemakkelijk van de tak afhalen; de [Ziekenhuisboomkorst](#) ruikt naar ontsmettingsmiddel. Let wel op want deze laatste groeit enkel op loofhout, op naaldhout groeit zijn dunnere dubbelganger, het Naaldhoutwasje.

Eetbare paddenstoelen vervaagd op waarnemingen.be

De aprilmaand is de periode van de morieljes. Deze worden vaak in Italië overal in restaurants geserveerd, maar bij ons zijn ze zeldzaam. De Gewone morielje groeit saprotoof op wortels van vooral Iep, maar ook Es en Beuk. Vaak geven mensen de vindplaats van deze zeldzame lekkernijen niet graag vrij. Maar wees gerust, op waarnemingen.be worden ingevoerde waarnemingen van gegeerde paddenstoelen vervaagd tot op 1 km², zodanig dat chefkoks lang mogen zoeken achter hun schaarse buit (als die tegen dan al niet vergaan is). Indien je nog soorten noteerde op dezelfde plaats, kan je die beter op een andere dag invoeren. Want anders wordt het voor verzamelaars wel erg gemakkelijk om te gissen...

Natuurpunt Ninove op zoek naar voorjaarszwammen

Verschillende werkgroepen organiseren voorjaarsexcursies. Ook Natuurpunt Ninove waagde zich aan een paddenstoelenzoektocht in het vroege voorjaar: op 29 maart werd onder begeleiding van Wim Veraghtert de Phenixberg te Okegem bezocht. Dit resulteerde in een lijstje van ca. 50 soorten. Een opvallende aanwezige was de Anemonen-bekerzwam (*foto links, Jef Verkens*), die er massaal op de wortelstokken van bosanemonen parasiteerde. Op vlak van plaatjeszwammen is het nog rustig. Soorten als [Vroege franjehoed](#) en Week oorzwammetje werden de voorbije week meermaals gemeld. Maar het merendeel van de soorten zijn toch hout- en korstzwammen, vaak minuscule kleine ascomyceten, zoals het in deze periode algemene Peppelknopschoteltje (op oude afgevallen knopschubben van Populier) en tal van slijmzwammen die profiteren van het vochtige weer.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Klik dan [hier](#).
Heb je opmerkingen of vragen? Mail dan naar roosmarijn.steeman@natuurpunt.be.