


Van: Natuurpunt <no.reply@natuurpuntwebsite.be>
Verzonden: donderdag 13 november 2014 21:35
Aan: Nieuwsarchief
Onderwerp: Paddenstoelen.flits



Paddenstoelen.flits

november 2014

-
- [Paddenstoel van de maand: Roodbruine schijnridder](#)
 - [Gazonpaddenstoelen in Watermaal-Bosvoorde](#)
 - [Papegaaizwammetje soort van het jaar in Nederland](#)
 - [Paddenstoelennamen in waarnemingen.be](#)
 - [Grote symbionten versus kleine saprophyten](#)
 - [Proeven van KVMV](#)

Paddenstoel van de maand: Roodbruine schijnridderzwam



Vanaf eind oktober tot in december kan je de Roodbruine schijnridderzwam (*Lepista flaccida*) vinden in grote groepen of heksenkringen. Deze

schijnridderzwam lijkt hard op een trechterzwam, de plaatjes lopen sterk af naar beneden en het centrum van de hoed is

verdiept. Schijnridderzwammen worden op basis van microscopische kenmerken niet bij de trechterzwammen geplaatst. De kleur van de hoed kan variëren van roodbruin tot okergeel. Lichtere vormen zijn te verwarren met Slanke trechterzwam, die een meer vezelige hoed heeft, vaak een bultje in het midden en dichter bijeen staande plaatjes. Bovendien is het vlees van Roodbruine schijnridderzwam veel steviger dan dat van de Slanke trechterzwam. De diameter van de hoed van roodbruine schijnridderzwam is gemiddeld 3 tot 8 cm. De steel is gemiddeld 2,5 tot 6 cm hoog en 2 tot 5 mm breed.

Roodbruine schijnridderzwam is een opruimer van dorre bladeren en naalden op stikstofrijke bodem.

Hoewel de Roodbruine schijnridderzwam een zeer algemene paddenstoel is, wordt hij toch opgevolgd als [meetnetsoort in Nederland](#). Deze zwam is een indicator voor aanrijking door bemesting, versnelde strooiselafbraak of zure stikstofrijke regen. Daarnaast werd deze opvallende soort ook opgenomen voor de belevingswaarde.

Roodbruine schijnridderzwam kan je nu in de meeste bossen, gecamoufleerd tussen de bladeren vinden. Voer je vondsten in op [waarnemingen.be](#)

Gazonpaddenstoelen in Watermaal-Bosvoorde

Op **maandag 10 november** ging de eerste gazonpaddenstoel excursie door met 15 deelnemers, 13 soorten wasplaten en een nieuwe soort voor Brussel/Vlaanderen: [de Koraaltrilzwam](#). Op **zondag 16 november** krijg je nog eens de kans om te genieten van prachtige graslandpaddenstoelen. We hopen dat de deelnemers aan deze uitzonderlijke excursies zin krijgen om daarna zelf op zoek te gaan naar deze soorten in gazons. Er zijn nog plaatsen vrij voor zondag, wie mee wil geeft een seintje aan [Roosmarijn](#).



Papegaaizwammetje soort van het jaar in Nederland




In Nederland werd het [Papegaaizwammetje](#) soort van het jaar 2014. Bedoeling is dat er dan extra uitgekeken wordt naar deze soort, één van de makkelijkst herkenbare en fraaiste wasplaten. In Vlaanderen wordt de soort [vooral in de Leemstreek](#)

gevonden.

In Engeland heeft men het variabele Papegaaizwammetje eens moleculair bekeken en kwam men tot de vaststelling dat Papegaaizwammetjes met een bleke steel en een purperen hoed een aparte soort zijn (***Gliophorus reginae***, foto rechts) en dat Bruinrode papegaaizwammetjes, eveneens zonder groene tinten, nu de naam [Gliophorus europaerplexus](#) krijgen. De eerder beschreven soort *Hygrocybe perplexus*, blijkt een Amerikaanse soort te zijn.



Paddenstoelenwaarnemingen in waarnemingen.be



Wie regelmatig paddenstoelen invoert in waarnemingen.be zal het wel al gemerkt hebben, er is recent heel wat veranderd aan de namenlijst. Naar aanleiding van de publicatie van de [Nieuwe standaardlijst voor Nederland](#), waarin heel wat soorten een nieuwe wetenschappelijke naam kregen, was een update van de soortenlijst van waarneming.nl noodzakelijk. Daar wij de soortenlijsten delen met de Nederlanders...met als enige verschil enkele soorten die nog niet in Nederland werden gezien en omgekeerd, kreeg ook de Belgische lijst een update. Hierbij worden de "oude" wetenschappelijke namen in het systeem gehouden... maar enkel bij de "nieuwe" bij voorkeur gebruikte wetenschappelijke naam werd een Nederlandse naam toegevoegd.

Dit heeft helaas als gevolg dat er geen Nederlandse namen meer worden vermeld bij waarnemingen die voor september 2014 werden ingevoerd. Wie via obsmapp invoert, ziet bij thuiskomst dat een aantal soorten geen Nederlandse naam krijgen, omdat ze nog onder de oude wetenschappelijke naam werden ingevoerd. Wij willen alle **obsmappgebruikers** dan ook

aanbevelen om een [update van de soortenlijst](#) door te voeren, dan is dit probleem meteen verholpen.


Zijn er paddenstoelnamen die je niet in de lijst terug vindt? Neem dan contact op met [Roosmarijn](#).

Grote symbionten versus kleine saprofyten



Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, maar paddenstoelen die in symbiose leven met bomen en struiken zijn gemiddeld groter dan vruchtlichamen van saprotrofe soorten. Dat stelden mycologen pas vast in een recente analyse. Dat lijkt inderdaad steek te houden. Denk aan forse boleten (eekhoorntjesbrood, foto links), amanieten, ridderzwammen, etc. die allemaal symbiont zijn. Bij de saprofyten zitten dan weer een hele hoop kleintjes zoals mycena's (Roze peutermycena, foto rechts), taailingen, breeksteeltjes, oorzwammetjes, etc. De reden daarvoor zou

precies in de leefwijze liggen. De koolstof die zwamvlokken nodig hebben voor de productie van vruchtlichamen krijgen symbionten precies van bomen. Een wat comfortabele situatie die hen in staat stelt om forse vruchtlichamen te produceren. Saprofyten halen zelf de koolstof uit strooisel en grote hoeveelheden daaruit halen kost veel moeite. Bovendien kunnen kleine zwamvlokken die kleine substraten zoals dennennaalden koloniseren, moeilijk forse vruchtlichamen produceren. Logisch dat die Paardenhaartaailing zo klein is.



Proeven van KVMV

De Koninklijke Vlaamse Mycologen Vereniging is de ideale leerschool voor mensen die verder dan veldbepalingen willen gaan. Als lid kan je met alle excursies mee van de vier afdelingen en ontvang je vier keer per jaar het [tijdschrift Sporen, waarvan je hier een voorbeeld](#) kan zien. Een meer gespecialiseerd tijdschrift, Sterbeekia (een tijdschrift dat faam heeft in het buitenland), verschijnt één keer per jaar. Eind maart, komt de hele werkgroep samen op de mycologendag die opgeluisterd wordt door interessante voordrachten. De afdelingen hebben buiten excursies ook

determinatieavonden en voordrachten. Jaarlijks is er een meerdaagse waar na de excursies gezamenlijk aan microscopie wordt gedaan. Meer info over KVMV, [vind je op de website](#).

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Klik dan [hier](#).
Heb je opmerkingen of vragen? Mail dan naar roosmarijn.steeman@natuurpunt.be.

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by [Amsab-ISG](#), and is believed to be clean.