

Van: Natuurpunt <no.reply@natuurpuntwebsite.be>
Verzonden: woensdag 20 maart 2013 20:11
Aan: Veerle Solia
Onderwerp: Vlinder.flits



Vlinder.flits

20 maart 2013

- **De eerste vlinders zijn (waren?) wakker**
- **'Dagvlinders in Vlaanderen' bijna daar!**
- **Nieuwe aanpak voor de Vlinderwerkgroep**
- **Nieuws van lokale vlinderwerkgroepen**
- **Nieuwe functies op waarnemingen.be**
- **Gluren bij de burens**
- **Hoe spinnen de evolutie van vlinders beïnvloeden**

Eerste vlinders zijn (waren?) wakker!

Het eerste lenteweer in het begin van de maand zorgde meteen voor een hoop dagvlinderactiviteit.

Tussen 3 en 9 maart werden al 334 Citroenvlinders, 79 Dagpauwogen, 79 gehakelde aurelias en maar liefst 417 Kleine vossen gemeld op waarnemingen.be.

Nadien viel dat weer helemaal stil. Pas als de



temperaturen stilletjes terug oplopen, zullen de vlinders die als volwassen dier overwinteren, weer actief worden. Op de eerste pop-overwinteraars zoals het boomblauwtje is het nog even wachten. Je kan alles volgen via de **[pagina's met vlinderwaarnemingen op waarnemingen.be](#)**. Maar beter nog trek je er zelf op uit natuurlijk. We kijken samen met u uit naar de lente!

'Dagvlinders in Vlaanderen' bijna daar!

Het standaardwerk 'Dagvlinders in Vlaanderen. Ecologie, verspreiding en behoud' dateert intussen al van 1999. In die tijd werd er veel nieuwe kennis verzameld, kwamen er allerlei acties en beschermingsinitiatieven en vooral: heel veel nieuwe waarnemingen. Al deze informatie werd gebundeld in het nieuwe handboek '**Dagvlinders in Vlaanderen. Nieuwe kennis voor slimme actie**'. Auteurs zijn de Vlinderwerkgroep bestuursleden Dirk Maes, Wouter Vanreusel en Hans Van Dyck.



Het boek bespreekt in detail alle inheemse en uitgestorven dagvlindersoorten én ook de nieuwkomers. Kern van het boek zijn de verspreidingskaarten die opgesteld werden aan de hand van meer dan 780.000 vlinderwaarnemingen, voor het overgrote deel verzameld door vrijwilligers. Ze vergelijken de toestand van 2001-2010 met die van 1991-2000, en het blijkt dat er al heel wat veranderde. Ook de meest recente wetenschappelijke inzichten rond dagvlinderecologie, -beheer, en -verspreiding worden bevattelijk samengevat en met tal van figuren en cijfers onderbouwd. De auteurs formuleerden ook concrete adviezen rond vlinderbescherming voor beheer en beleid. Tekstboxen door tal van vrijwilligers en organisaties geven inspirerende voorbeelden

over hoe overal in Vlaanderen nu al aan dagvlinderonderzoek en -bescherming wordt gedaan.

Het boek verschijnt in de tweede helft van mei en zal 39,99 euro kosten. Wie voorintekent voor eind april, betaalt slechts 32 euro. Via de **winkel van Natuurpunt** kan je het boek bestellen. Zodra het boek beschikbaar is, krijg je een factuur in de bus en kan je het afhalen of laten verzenden.

Nieuwe aanpak voor de Vlinderwerkgroep

De Vlinderwerkgroep van Natuurpunt vormt de koepel van lokale en regionale vlinder- en studiewerkgroepen die zich met vlinders bezig houden. Daarbij tracht de Vlinderwerkgroep zowel lopende projecten te promoten (bijv. de **soortbeschermingsplannen** rond Argusvlinder, Bruine eikenpage en Heivlinder), als nieuwe initiatieven op te zetten. De voorbije jaren was de balans tussen professionele experts en lokale vrijwilligers in de Vlinderwerkgroep scheefgegroeid. Daarom wordt er dit jaar terug maximaal ingezet op het ondersteunen én activeren van lokale vlinderwerkgroepen. Het eerste resultaat is een **kalender met vlinderactiviteiten** in heel Vlaanderen. Daarnaast hebben we ook de stap naar Facebook gezet. Vind jij **onze pagina** al leuk?



Nieuws van de vlinderwerkgroepen

Hesperia zet de Veldparelmoervlinder in de kijker

De Veldparelmoervlinder is één van de meest bedreigde vlindersoorten in Vlaanderen. In Lommel werd een kleine populatie aangetroffen in het gebied 'Den Tip'. Daar brengt **Vlinderwerkgroep Hesperia** dit jaar deze populatie in



kaart en gaat er, in samenwerking met plantenwerkgroep 'de Slobkousjes', na in welke dichtheden de waardplant Smalle weegbree op verschillende percelen voorkomt, naast interessante nectarplanten. Aangezien ook het beheerteam van Natuurpunt Noord-Limburg, dat instaat voor het beheer van 'Den Tip', wordt betrokken, kan

deze studie zo leiden tot een aangepast beheer in functie van deze zeldzame soort. Meer informatie: **Rudi Wouters** & **Jan Leroy**, Vlinderwerkgroep Hesperia en Werkgroep de Slobkousjes.

Dagvlinderproject Durme- en Scheldegebied

In de Durme- en Schelderegio start dit jaar een inventarisatieproject rond dagvlinders. Daarbij worden voor de hele regio zoveel mogelijk vlinderwaarnemingen verzameld, die gecentraliseerd worden op www.waarnemingen.be. Het projectgebied loopt van Wichelen tot Stekene en van Temse tot Lochristi. Een infomoment over dit dagvlinderproject wordt op 30 maart gehouden in het bezoekerscentrum Molsbroek te Lokeren (om 14h). Inschrijven verplicht bij couckuyt.jurgen@telenet.be.



Nieuwe functies op waarnemingen.be

Recent werd de website waarnemingen.be van nieuwe snuffjes voorzien. Zo is het nu mogelijk om de verspreidingsgegevens van 2 verschillende soorten op één kaart te tonen. Je kan nu bijv. de verspreiding van de **Sleedoorn** vergelijken met die van de **Sleedoorn**. Wil je in één oogopslag zien hoe sterk de verspreiding van Hooibeestje verschilt met die van Oranje zandoogje? Geen probleem! Bij de optie 'Kaarten' selecteer je nu een tweede soort naar keuze.

Gluren bij de burens

De jaarlijkse hoogdag van de Nederlandse Vlinderstichting is weer achter de rug. Op 2 maart kwamen meer dan 600 vlinderliefhebbers naar Wageningen om op de Landelijke Vlinderdag **boeiende lezingen** over dag- en nachtvlinders bij te wonen. De presentaties daarvan kan u nog bekijken op de website van de Vlinderstichting. Het boek '**Nachtvlinders belicht**' werd er voorgesteld en leert ons ondermeer dat amper 35% van de Nederlandse macro-nachtvlinders momenteel niet bedreigd is. En hoe slecht 2012 precies voor vlinders was, leest u in de '**Vlinderstand 2013**'.

Hoe spinnen de evolutie van vlinders beïnvloeden

Al in de negentiende eeuw had men door dat predatoren het uitzicht van hun prooi beïnvloeden. Daarbij werd in de eerste plaats aan vogels gedacht: denk maar aan de nep-ogen van de Dagpauwoog. Amerikaanse onderzoekers hebben pas ontdekt dat ook spinnen daarin een rol spelen. Bij de kleine page **Calycopis cecrops** lijkt het vlekje langs de achterrand van de vleugel (cfr. onze Eikenpage) in combinatie met het staartje een 'nephoofd' te vormen dat 100% efficiënt is bij het misleiden van springspinnen. Daarover lees je **hier** meer.

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Klik dan [hier](#).
Heb je opmerkingen of vragen of ideeën voor de volgende vlinder.flits? Mail dan naar vlinders@natuurpunt.be.